

◆ニコチン依存症の診断「TDS」 ◆

“TDS (the Tobacco Dependence Screener : 0~10 点) で

5 点以上の場合は「ニコチン依存症」の可能性が高いと思われます。

設問内容		はい	いいえ
		1 点	0 点
1	自分が吸うつもりよりもずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか		
2	禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか		
3	禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることはありませんでしたか		
4	禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか（イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加）		
5	4 どうかかった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか		
6	重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか		
7	タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっているのに、吸うことがありましたか		
8	タバコのために自分に精神的問題が起きているとわかっているのに、吸うことがありましたか		
9	自分はタバコに依存していると感じることがありましたか		
10	タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか		
合計			